




# Manejo de la Rosellinia

Amigo agricultor no se deje coger ventaja de la **Rosellinia**, reconozca el grado de infección que puede tener un cultivo afectado, y haga lo siguiente.



## Árboles muertos

Los árboles clasificados en G1 o muertos deben arrancarse y repicarse.



## Árboles sintomáticos

Erradique los árboles G2 o sintomáticos, con herbicida sistémico, inyectando al xilema y floema para darles muerte instantánea.



Arranque, amontone y queme todo residuo de árboles, vegetal fresco, hojarasca del centro del foco (G1 y G2).



## Árboles posiblemente afectados.

En los árboles G3, pode las raíces de todos los árboles en círculo a 40 cm del tallo y a 20 cm de profundidad y realice poda aérea.



## Árboles sin contaminación

Pode las raíces de los árboles G4 en medio círculo a 40 cm del tallo y a 20 cm de profundidad.



## Árboles sanos

Mantenga los árboles G5 limpios de la hojarasca.

## Al finalizar el proceso

Repique el área G1 que fue afectada a 20 cm de profundidad y exponga al sol.

A los dos meses siembre maíz o gramínea y al estar a la altura de la rodilla corte, repique y mezcle incorporándola al suelo.

Finalmente, siembre en el área plátano, cacao u otra especie.



Ya que sabe cómo controlar la **Rosellinia** revise sus cultivos con frecuencia, y recuerde no dejarse coger ventaja.